

**DATI TECNICI**

<b>Composizione</b>	Forum 50 WP: 100 g di prodotto contengono 50% di dimetomorf Polyram DF: 100 g di prodotto contengono 71,2% di metiram puro
<b>Formulazione</b>	Forum 50 WP: Polvere bagnabile Polyram DF: Granuli idrodispersibili
<b>Classificazione</b>	Forum 50 WP: n.c., Non classificato - N, Pericoloso per l'ambiente Polyram DF: Xi, Irritante - N, Pericoloso per l'ambiente
<b>Reg. Min. Salute</b>	Forum 50 WP: N° 8542 del 30 -11-1994 Polyram DF: N° 7916 del 30 - 04 -1990
<b>Confezione</b>	Combi pack: sacco da 1,2 Kg contenente 6 sacchetti da 200 g di Forum 50 WP + 3 sacchi da 2 Kg di Polyram DF
<b>Imballo</b>	Cofanetto

**CARATTERISTICHE**

È il fungicida che nasce dalla combinazione di Forum 50 WP (dimetomorf) e Polyram DF (metiram) in combi-pack. La combinazione in miscela estemporanea permette un ottimale controllo della peronospora della Vite. Grazie a diversi anni di esperienza, Forum 50 WP e Polyram DF si sono guadagnati l'apprezzamento di tecnici e operatori, ottenendo sul campo la fama di specialisti indiscussi per la difesa dell'uva. Forum Top Pack sfrutta l'ideale sinergia tra Forum 50 WP e Polyram DF, esaltando le caratteristiche dei due principi attivi. Forum Top Pack viene rapidamente assorbito e ridistribuito all'interno della foglia. L'attività di copertura è garantita da metiram che, a differenza degli altri ditio-carbammati, possiede una catena ramificata e vanta la presenza di zinco. Grazie a questa particolare struttura, oltre a garantire protezione contro la peronospora, metiram contribuisce all'apporto di mesoelementi nutritivi.

**MODALITÀ D'USO**

Si consiglia l'impiego di Forum Top Pack nell'ambito di un programma di trattamenti preventivi che preveda la rotazione di formulati a base di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo d'azione. Nel caso in cui si segua l'applicazione a turno fisso, utilizzare Forum Top Pack alle seguenti fasi fenologiche: grappoli formati, inizio fioritura, fine fioritura-allegagione, pre-chiusura grappolo. Se invece si intende seguire l'applicazione a turno biologico è necessario cominciare i trattamenti alla prima pioggia infettante (regola dei 3 dieci) rispettando poi una cadenza pari a 10-12 giorni.

**AVVERTENZE**

Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida o insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). Si consiglia di distanziare le applicazioni con olii di almeno tre settimane.

**CAMPI E DOSI D'IMPIEGO**

Coltura	Patogeno	Dose (g/hl)	Dose (kg/ha)	Epoca d'impiego	Intervallo di sicurezza (gg)
Vite	Peronospora	Forum 40 - 50 Polyram 150 - 200	0,4 - 0,5 1,5 - 2	Turno fisso: trattare alle fasi di grappoli formati, inizio fioritura, fine fioritura-allegagione e pre-chiusura grappolo Turno biologico: trattare a partire dalla prima pioggia infettante (regola dei 3 dieci) con cadenza di 10-12 gg	28

Forum<sup>®</sup> Top  
Pack

Fungicida sistemico locale,  
ad ampio spettro d'azione  
per Vite, Pomodoro e Melone